



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ШКУРКИ ЕНОВОИДНОЙ СОБАКИ  
КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 27766—88**

**Издание официальное**

**БЗ 6—88/443**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ШКУРКИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ  
КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Undressed skins of raccon of cage breeding  
Specifications**ГОСТ  
27766—88**

ОКП 98 7000

Срок действия с 01.01.90  
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шкурки енотовидной собаки клеточного разведения невыделанные.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки должны быть сняты с тушек «трубкой» с разрезом, проходящим от фаланг пальцев одной из задних лап до другой (по линии волосораздела черева и огузка), с сохранением меха головы (с носиком и ушами), хвоста, лап (с коготками).

Шкурки должны быть очищены от прирезей мяса, хрящей, костей из лап и хвоста; обезжирены без повреждения корней волос; очищены от грязи и крови с кожной ткани и волосяного покрова; прочесаны; оправлены на правилке (приложение 1), с расправленными в длину и ширину хвостом и лапами; законсервированы пресно-сухим способом и вывернуты волосом наружу.

1.2. Шкурки енотовидной собаки должны иметь густой и пышный волосяной покров в основном от темно-коричневого до светло-коричневого цвета с буроватым, желтым, серовато-серебристым оттенками.

Остевые волосы зонарно окрашены. Вершины остевых волос черного и бурого цвета, светлая зона остевых волос от белого до желтого и оранжевого цвета.

Основания пуховых волос от светло- до темно-голубого цвета, вершины пуховых волос от светло-желтого и светло-коричневого до ярко-желтого и оранжевого цвета.

1.3. В зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани шкурки енотовидной собаки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

| Сорт | Характеристика волосяного покрова и кожной ткани  |
|------|---|
| 1    | Полноволосый, густой и пышный, с развившимися направляющими и остевыми волосами. Кожевая ткань плотная, светлая с легкой синевой по всей площади шкурки |
| 2    | Менее полноволосый, с недоразвившимися остевыми и пуховыми волосами. Кожевая ткань рыхлая, синеватая по всей площади шкурки                             |

Примечание. В определении сортности характеристика волосяного покрова является основным показателем, состояние кожной ткани — дополнительным.

1.4. Размеры шкурок должны соответствовать требованиям табл. 2.

Таблица 2

| Размерная категория шкурки | Длина шкурки от середины междуглазья до основания хвоста, см | Однократная ширина шкурки по линии, проходящей через среднюю точку ее длины, см |
|----------------------------|--|---|
| 0                          | 96,0—103,9   | Не менее 12,5   |
| 1                          | 88,0—95,9  |   |
| 2                          | 80,0—87,9  |   |
| 3                          | 72,0—79,9  |   |
| 4                          | 64,0—71,9  |   |
| 5                          | 56,0—63,9  |   |

Примечание. Шкурки енотовидной собаки, длина которых превышает требования размерной категории 0, относят к размерным категориям 00, 000 и т. д. При этом интервал длины между размерными категориями шкурок остается постоянным и равным 8 см.

1.5. В зависимости от наличия пороков шкурки енотовидной собаки подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 3.

1.6. На шкурках допускается не более одного порока данной группы, указанной в табл. 3. При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

Таблица 3

| Наименование порока  | Группа         |   |  |  |
|--|----------------|---|--|--|
|  | Первая         | Вторая                                    | Третья   | Четвертая  |
| 1. Подпарины общей площадью в % к площади шкурки   | Не допускаются | Не допускаются                            | До 1,3 включ.  | Св. 1,3 до 2,5 включ.  |
| 2. Сеченность волосяного покрова, вытертые места, свалывшийся волосяной покров общей площадью в % к площади шкурки           | До 0,2 включ.  | Св. 0,2 до 1,0 включ.                     | Св. 1,0 до 2,5 включ.  | Св. 2,5 до 4,5 включ.  |
| 3. Сеченность волосяного покрова, вытертые места, свалывшийся волосяной покров по череву общей площадью в % к площади шкурки | До 0,5 включ.  | Св. 0,5 до 3,0 включ.                     | Св. 3,0  | —  |
| 4. Повреждение волосяного покрова на шейной части и «душке»  | Не допускаются | Третья душка без повреждения шейной части | Третья душка с повреждением шейной части   | —  |
| 5. Дыры, плешины общей площадью в % к площади шкурки   | До 0,2 включ.  | Св. 0,2 до 1,5 включ.                     | Св. 1,5 до 2,5 включ.  | Св. 2,5 до 4,5 включ.  |
| 6. Сквозной волос, выхваты общей площадью в % к площади шкурки   | До 1,0 включ.  | Св. 1,0 до 3,0 включ.                     | Св. 3,0 до 20,0 включ.   | Св. 20,0 до 50,0 включ.  |
| 7. Разрывы и швы общей длиной в % к длине шкурки   | До 13,0 включ. | Св. 13,0 до 26,0 включ.                   | Св. 26,0 до 65,0 включ.  | Св. 65,0 до однократной длины шкурки или шкурки, порванные поперек |
| 8. Признаки весенней линьки  | Не допускаются | Не допускаются                            | Шкурки с развитым волосяным покровом, но поредевшими остьками и пухом на боках и череве; мездра грубоватая с утолщением в шейной части | —  |

| Наименование порока                                   | Группа         |   |  |               |
|---|----------------|---|--|---------------|
|   | Первая         | Вторая  | Третья   | Четвертая     |
| 9. Недостача частей шкурки                            | Не допускаются | Головы или хвоста, вырезанные края огузка                 | Вырезанное черевцо   | Головы с шей  |
| 10. Неправильная съемка, правка и первичная обработка | Не допускаются | Плохо обезжиренные и загрязненные по волосу и кожей ткани | Шкурки с изреженным волосяным покровом на боках и шейной части вследствие перетянутости или шкурки, имеющие ширину менее 12,5 см | Комовая сушка |

Примечание. При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учитывают наибольший порок.

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более трех различных пороков группы «вторая» или пяти пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие не более двух пороков группы «третья» или пяти пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и трех пороков группы «вторая».

1.7. Оценку качества шкурок енотовидных собак производят в соответствии с приложением 2.

1.8. Характеристика пороков дана в приложении 4.

1.9. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 12266—66.

1.10. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14292—77.

1.11. Каждую шкурку маркируют у основания хвоста, а при его отсутствии — на одной из задних лап игольчатым клеймом хозяйства.

## 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста с погрешностью не более 0,5 см.

Ширину шкурки измеряют посередине длины с погрешностью не более 0,5 см.

2.2. На шкурках с вытянутым огузком у основания хвоста длину шкурок измеряют от середины междуглазья до линии, соединяющей краевые точки боков огузка.

2.3. Шкурки с пороками, оценка которых проводится по площади, распределяют по группам пороков в зависимости от площади порока и размера шкурки в соответствии с приложением 3.

2.4. Площадь пороков определяют путем вычисления площади прямоугольника или треугольника, в который вписывается данный порок, с погрешностью не более 0,5 см<sup>2</sup>.

2.5. Поредение ости на боках определяют при сложении шкурки по средней линии хребта и черева.

### 3. ПРИЕМКА


3.1. Шкурки енотовидной собаки принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, но не более 3 000 шт., оформленное одним документом о качестве.

3.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по всем показателям внешнего вида и размера в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Шкурки енотовидной собаки транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Правилка для шкурок енотовидной собаки



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Обязательное

## Оценка качества шкурок енотовидной собаки, %

Таблица 4

| Размерная категория шкурки | 1-й сорт       |        |        |           | 2 й сорт       |        |        |           |
|----------------------------|----------------|--------|--------|-----------|----------------|--------|--------|-----------|
|                            | группа пороков |        |        |           | группа пороков |        |        |           |
|                            | Первая         | Вторая | Третья | Четвертая | Первая         | Вторая | Третья | Четвертая |
| 0                          | 130,0          | 117,0  | 97,5   | 65,0      | 104,0          | 93,6   | 78,0   | 52,0      |
| 1                          | 120,0          | 108,0  | 90,0   | 60,0      | 96,0           | 86,4   | 72,0   | 48,0      |
| 2                          | 110,0          | 99,0   | 82,5   | 55,0      | 88,0           | 79,2   | 66,0   | 44,0      |
| 3                          | 100,0          | 90,0   | 75,0   | 50,0      | 80,0           | 72,0   | 60,0   | 40,0      |
| 4                          | 90,0           | 81,0   | 67,5   | 45,0      | 72,0           | 64,8   | 54,0   | 36,0      |
| 5                          | 80,0           | 72,0   | 60,0   | 40,0      | 64,0           | 57,6   | 48,0   | 32,0      |

## Примечания:

1. Скидка от оценки по качеству в процентах:

2 — за отсутствие каждой лапы;

5 — за отсутствие хвоста, неправильный разрез по огузку.

2. Пороки на голове, шее, череве оценивают не выше скидок, установленных за недостаю этих частей.

3. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, длиной менее 56 см; шкурки весенние или поздневесенние, с поредевшим волосяным покровом, летние с грубой остью и редким пухом, раннеосенние с низким волосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, шкурки щенков с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным и оценивают не более 35% от качества шкурок 1 сорта, 1 группы пороков, 3 размерной категории.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

С. 8 ГОСТ 27766-88

Таблица 5

Площадь пороков в см<sup>2</sup> для шкурок различных размерных категорий

| Размерная категория шкурки | Отношение площади пороков в % к общей площади шкурки |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|----------------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                            | 0,2  | 0,5  | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 20,0 | 50,0 |
| 0                          | 5,0  | 13,0 | 25  | 33  | 38  | 63  | 75  | 88  | 113 | 500  | 1250 |
| 1                          | 5,0  | 12,0 | 23  | 30  | 35  | 58  | 69  | 81  | 104 | 460  | 1150 |
| 2                          | 4,0  | 11,0 | 21  | 27  | 32  | 53  | 63  | 74  | 95  | 420  | 1050 |
| 3                          | 4,0  | 10,0 | 19  | 25  | 29  | 48  | 57  | 67  | 86  | 380  | 950  |
| 4                          | 3,0  | 9,0  | 17  | 22  | 26  | 43  | 51  | 60  | 77  | 340  | 850  |
| 5                          | 3,0  | 8,0  | 15  | 20  | 23  | 38  | 45  | 53  | 68  | 300  | 750  |

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

1. Вытертое место — участок шкурки частично лишенный волосяного покрова в результате механического повреждения.
2. Горелая шкурка — шкурка с потемневшей или ослабленной кожной тканью вследствие окисления остатков подкожного жира.
3. Кожедина — участки кожной ткани шкурок с углублениями и отверстиями — следами пищевых ходов личинок кожных насекомых.
4. Молесина — повреждение волосяного покрова или кожной ткани шкурки личинками моли.
5. Комовая сушка — шкурки, высушенные в нерасправленном виде.
6. Подпарина — участки шкурки, лишенные волосяного покрова и эпидермиса вследствие бактериального поражения кожной ткани.
7. Плешина — участки шкурки, полностью лишенные волосяного покрова вследствие прижизненных травм и заболеваний животных, а также вследствие механического повреждения шкурок при их первичной обработке.
8. Прелая шкурка — шкурка, кожная ткань которой подверглась разрушению вследствие бактериального поражения.
9. Признаки весенней линьки — поредение ости на боках и шейной части.
10. Сеченность волосяного покрова — облом вершин кроющих волос.
11. Свалянность волосяного покрова — спутанность волос до образования войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию.
12. Сквозной волос — обнажение корней волос.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госагропромом СССР

#### ИСПОЛНИТЕЛИ

В. С. Снытко, канд. с.-х. наук; И. В. Шаповалова

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.88 № 2437

3. Срок первой проверки — 1994 г.  
Периодичность проверки — 5 лет

### 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН- ТЫ

| Обозначение НТД,<br>на который дана ссылка | Номер пункта |
|--|--------------|
| ГОСТ 12266—66                              | 1.9          |
| ГОСТ 14192—77                              | 1.10         |

Редактор *Г. П. Шашина*  
Технический редактор *Л. А. Никитина*  
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 15.07.88. Подп. в печ. 19.09.88 0,75 усл. печ. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,49 уч.-изд. л.  
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2780